

# ÉCHELE CABEZA

[www.echelecabeza.com](http://www.echelecabeza.com)

IMFORME PRIMER SEMESTRE 2018



Bogotá  
Junio - 2018

# Equipo de intervención

Vannesa Morris  
Coordinadora del proyecto

Julián Quintero  
Director ATS

Jonathan Tapias  
Coordinador Servicio de Análisis de Sustancias

Felipe Cuervo  
Voluntario

Christian Gordillo  
Voluntario

Alejandra Medina  
Voluntaria

David Moreno  
Voluntario

Manuela Peña  
Voluntaria

Andrés Guevara  
Voluntario

Gabriela Escobar  
Voluntaria

Juan Camilo Carvajal  
Voluntario

Daniel Rojas  
Voluntario

Juan Pablo Olmos  
Voluntario

Simón Gutiérrez  
Diseño – Web master



# INTRODUCCIÓN



El siguiente informe contiene los principales resultados y hallazgos de las intervenciones realizadas por Échele Cabeza en el primer semestre 2018: El Row, Estéreo Picnic y Baum, donde además realizamos un comparativo de estos dos últimos eventos desde el año 2015.

## Principales hallazgos y conclusiones:

- Un aumento considerable en los resultados positivos frente a los negativos en pastillas de éxtasis, cristales de MDMA y 2cb. Sin embargo, aunque existe un aumento en resultados positivos, encontramos en los resultados negativos la presencia de sustancias suplantadoras como Alfa PVP (Flakka), PMA, MDPV, catinonas y metanfetamina.
- Aumento en la presentación de las sustancias en forma de “gomitas” de diferentes colores y formas, con presencia de éxtasis y otras como falsos LSD.
- Vuelven las pastillas “Heisenberg” azules con presencia de metanfetamina. Frente a esto queremos advertir a los usuarios tener cuidado con estas pastillas si no conocen los efectos de esta sustancia y si los efectos buscados son diferentes.
- Cada vez son más las personas que se acercan al stand de Échele Cabeza para analizar sus sustancias antes de consumirlas. Se observa el aumento del número de muestras analizadas desde el 2015 en los festivales Baum y Estéreo Picnic.
- Reaparece el LSD en forma de micropuntos y gotas. También aumenta los resultados positivos en las muestras analizadas, no obstante, hay que mantener la alerta en los papales secantes que supuestamente contienen LSD, pues muchas veces son suplantados con sustancias como el DOC o el NBOME.
- Hemos observado el aumento en las mezclas de alcohol y éxtasis, así como éxtasis con energizantes. Queremos llamar la atención sobre el riesgo de dichas mezclas, pues han sido varios los casos de intoxicación reportados por la interacción de estas sustancias. También la mezcla de MDMA con cocaína que aumenta los riesgos de sobreestimulación.


- Al confrontar las muestras analizadas con las bases de datos internacionales, observamos la presencia de pastillas altamente concentradas que pueden ir entre los 200 y 250 mg de MDMA. Esto sugiere alto riesgo de intoxicación y “mal viaje” si son consumidas enteras. Frente a esto recomendamos dosificar las pastillas, algunas de estas tienen “bisel” en la mitad, es decir una ranura para ser divididas. Consumirlas enteras podría provocar intoxicación y un “mal viaje”.
- Para el año 2018 en Estéreo Picnic el 10% de personas que analizaron consumieron por primera vez estas sustancias, y el 75% de las personas analizaron antes de consumir la sustancias, lo que indica un alto nivel de percepción de riesgo y toma de precauciones antes de consumir.
- Para el año 2018 en Baum Festival, el 9% de personas que analizaron consumieron por primera vez estas sustancias, y el 78% de las personas analizaron antes de consumir la sustancias, lo que indica un alto nivel de percepción de riesgo y toma de precauciones antes de consumir.
- Los resultados obtenidos a través de los últimos años demuestran que es posible la apropiación de practicas de autocuidado por parte de los consumidores de drogas. Lo que desemboca en la reducción de los riesgos y los daños asociados a estos consumos.
- Vemos un aumento en los análisis de sustancias por parte de las mujeres, lo que significa un gran paso al cuidado de salud y al reconocimiento como personas usuarias de sustancias.
- Al realizar los análisis preliminares y posteriormente la TLC (cromatografía en capa fina), encontramos la presencia de algunas sustancias suplantadoras y adulterantes como Alfa PVP (Flakka), PMA, MDPV, catinonas y metanfetamina, en muestras reportadas como MDMA en cristal, éxtasis en comprimido y el 2cb. Estas sustancias que hemos identificado podrían ser riesgosas y en algunos casos toxicas si no se conocen sus efectos, y tampoco se es conscientes que se está consumiendo. Por esta razón recomendamos a nuestros usuarios informarse sobre los efectos y analizar antes de consumir.
- En alianza con laboratorios especializados hemos podido comparar resultados y validar la efectividad de los análisis preliminares en campo superior al 90%. Además, en los análisis de TLC (cromatografía en capa fina) que realizamos a estas muestras, encontramos la presencia de las siguientes sustancias que también han sido validadas por los laboratorios. Es decir, que los usuarios pueden tener un alto grado de confiabilidad sobre los resultados y la asesoría que les brindamos.
- Aquí les contamos cuales fueron las sustancias que identificamos, cuáles son sus efectos y sus riesgos a la salud:



SUSTANCIA	¿QUÉ ES?	EFECTOS, RIESGOS Y POTENCIALES DAÑOS
Metanfetamina	La metanfetamina es un potente estimulante del sistema nervioso central. Sus efectos son más potentes que la anfetamina porque atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica. Su uso recreativo suele ser por la vía esnifada u oral, pero hay un uso fumado o inyectado. Por vía nasal y fumada los efectos aparecen casi inmediatamente, mientras que si se consume oralmente los efectos tardan una media hora en aparecer.	Los efectos principales de la metanfetamina son la sensación de energía y euforia, con incremento en el nivel de alerta y rendimiento intelectual, disminución de la necesidad de dormir y comer y dilatación pupilar. También aparecen otros efectos producto de la estimulación cerebral: aumento de la frecuencia cardíaca, del ritmo respiratorio y de la presión arterial, hipertermia, insomnio, 'mandibuleo' y convulsiones. Otros efectos secundarios son dolor de cabeza, boca seca, dificultades para orinar o para alcanzar la erección. Uno de los efectos de la metanfetamina, como sucede con las anfetaminas, es la pérdida de apetito.
α-PVP "Flakka"	Alfa-pirrolidinovalerofenona (α-PVP). Es una catinona sintética, análogo de sustancias como MDPV. Su fabricación principal se da en Asia, sin embargo, es distribuida a nivel mundial. Fue identificada por primera vez en Estados Unidos en 2012. Está estrechamente relacionado con las anteriormente vendidas como "sales de baño". Sus efectos normales constan de vasoconstricción, un aumento de la presión arterial, y taquicardia.	Hay pocos datos toxicológicos y clínicos, por lo que es una sustancia de alto riesgo para el consumo. α-PVP es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, debido a su acción sobre la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Al consumirse en grandes dosis se pueden presentar comportamientos paradójicos, extraños, agresivos o incluso violentos; paranoia, psicosis, alucinaciones o fiebre. Varios casos de muerte por α-PVP han sido reportados. Trastornos de la coagulación (que pueden derivar en derrame cerebral) y daño en tejido muscular son usuales en los episodios toxicológicos
PMA	La para-metoxianfetamina es un psicoestimulante y droga alucinógena, con propiedades alucinógenas cinco veces mayores que las de MDMA. Introducida como droga de diseño de la clase de anfetaminas con efectos serotoninérgicos. A diferencia de otras drogas similares de esta familia, la PMA no produce efectos estimulantes, euforizantes o entactógenos, y se comporta más como un antidepressivo. PMA se ha encontrado en tabletas promocionadas como MDMA (éxtasis) aunque sus efectos son marcadamente diferentes. Su tiempo de acción inicial se da en 1 a 2 horas (más que el MDMA), lo que alienta al consumidor a aumentar la dosis.	La PMA se ha asociado con numerosas reacciones adversas, incluida la muerte. Su respuesta fisiológica es mucho más impredecible de lo que se cree, incluso más variables entre individuos MDMA, por lo que algunos individuos sensibles pueden morir a partir de una dosis estándar de PMA, definida por una persona menos sensible. Si bien la PMA sola puede causar toxicidad significativa, la combinación de PMA con MDMA tiene un efecto sinérgico que parece ser particularmente peligroso; esto debido a que la PMA tiene un inicio lento de los efectos, lo que hace pensar la ausencia de actividad y con ello, el posterior consumo de una sustancia complementaria. La sobredosis de esta sustancia puede ser una emergencia médica grave especialmente si se mezcla con otras drogas estimulantes como la cocaína o la MDMA. Los síntomas característicos son fiebre pronunciada, taquicardia e hipertensión, junto con agitación, confusión, convulsiones, hipoglucemia, lo que puede ayudar a distinguirla de la sobredosis de MDMA. Las complicaciones pueden incluir síntomas más serios, como rabdomiólisis y hemorragia cerebral, los cuales requieren una intervención médica inmediata.
MXE	La metoxetamina es una artilciohexilamina de efectos principalmente disociativos. Prácticamente toda la información de la que se dispone proviene de experiencias personales de usuarios relatadas en foros, y en muy pocos casos ha sido posible asegurar que la sustancia consumida era realmente metoxetamina. No se dispone de ningún estudio sobre esta sustancia, ni en animales, ni en humanos.	Algunos consumidores han descrito bastantes similitudes con la ketamina, mientras que otros valoran los efectos como sustancialmente diferentes. Los efectos de la metoxetamina varían para cada persona. Normalmente en el inicio del efecto, los usuarios sienten una ligera sedación, un relajamiento de los músculos, y posiblemente un poco de empatía, intensificación de las experiencias sensoriales, euforia y estimulación. Si la dosis es más alta, suele haber una introspección psicodélica, casi como si uno cayera dentro de sí mismo y viera diferentes contenidos psicológicos.

<p>BUTILONA</p>	<p>Es un entactógeno (inducen la sensación de empatía), psicodélico y estimulante del grupo químico de las catinonas. Presenta efectos similares a las sustancias como MDMA y MBD. Provoca un aumento en los niveles de serotonina y dopamina extracelular, lo que puede generar sensación de euforia. Los efectos duran 10 -12 horas.</p>	<p>Como efectos adversos se puede presentar taquicardia, hipertensión, agitación, alucinaciones, confusión, midriasis y fiebre, seguido de convulsiones y falla renal. Los signos físicos de una intoxicación con catinonas sintéticas están asociados con un toxidrome simpaticomimético, entre ellos se cuentan taquicardia, palpitación cardíaca, arritmia, aumento de la presión sanguínea, dilatación capilar y hemorragia. También se puede presentar jaqueca, dilatación pupilar, náuseas, vómitos, supresión del apetito, bruxismo, hipertermia, deshidratación, sofocos, sudoración y convulsiones. En pacientes con sobredosis se ha visto desde hipertermia severa, hiponatremia, acidosis y convulsiones hasta edema cerebral, colapso cardiovascular, infarto al miocardio, falla multiorgánica y muerte. Efectos de comportamiento incluyen insomnio, confusión, agitación, ataque de pánico, ansiedad, paranoia severa, alucinaciones, psicosis, ideas suicidas y comportamiento autodestructivo, agresivo y violento .</p>
<p>MDPV</p>	<p>La metilendioxiropirrolona es una droga psicoestimulante altamente adictiva de la familia de las catinonas. Fue desarrollado por primera vez en la década de 1960, sin embargo, hasta 2004 se encontró indicios de su comercialización en mercados negros de SPA. Está químicamente vinculado a la pirovalerona, una droga estimulante abandonada debido al riesgo de abuso y riesgos significativos.</p>	<p>Los efectos principales pueden tener una duración de 30 minutos. La farmacología de MDPV es relativamente desconocida e inexplorada. Sus efectos principales son euforia, energía y motivación, sensación de bienestar, aumento de la sociabilidad, aceleración del pensamiento, modificación de la libido, disminución de la necesidad sentida de sueño. Taquicardia, vasoconstricción, presión arterial alta, a veces ansiedad extrema, paranoia y psicosis. Incluso, puede desatarse un paro cardíaco en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Tiene un efecto muy duradero, debido a su larga vida media en sangre. Por ello, el insomnio asociado es muy duradero y puede causar agotamiento latente, obligando al consumidor a usar tranquilizantes, opiáceos, antipsicóticos o sedantes para minimizar los efectos secundarios, lo cual aumenta el riesgo por policonsumo. El MDPV presenta un riesgo adictivo significativo (desarrollo de dependencia), aparición de tolerancia (necesidad de aumento de la dosis para un efecto similar al consumo inmediatamente anterior), lo que aumenta el riesgo de sobredosis. También, presenta un período llamado "anhelo", donde la necesidad de repetir compulsivamente el consumo del producto es muy fuerte, incluso cuando los efectos secundarios son desagradables.</p>
<p>CAFEINA</p>	<p>Estimulante directo y moderado del sistema nervioso central, también estimula el corazón y el sistema cardiovascular.</p>	<p>Estimula músculo voluntario y la secreción gástrica de ácido. Aumenta el flujo sanguíneo renal y tiene propiedades diuréticas moderadas. Al estar mezclado con sustancias como cocaína, presenta una acción sinérgica, lo que aumenta el riesgo de taquicardia y daños a nivel cardiovascular.</p>

# RESULTADOS GENERALES






# INTERVENCIÓN EL ROW




Sustancias  
analizadas

69




Muestras  
Positivas

56 (81%)



Muestras  
Negativas

13 (19%)



Usuarios que  
utilizaron S.A.S

46



# RESULTADOS



## MDMA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Adulterantes y suplantadores detectados
		+	%	-	%	
MDMA (Cristal)	14	12	86%	2	14%	Metanfetamina Alpha PVP MDPV
Sustancias negativas para MDMA						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>M010 0118</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>M057 0118</p> </div> </div>						



## ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Adulterantes y suplantadores detectados
		+	%	-	%	
ÉXTASIS	42	38	90%	4	10%	Catinonas (butilona y metilona) Sustancias desconocidas
Sustancias negativas para Éxtasis						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>E005 0118 "ILLUMINATI"</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>E019 0118 "PHILIPP PLEIN"</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>E047 0118 "NN"</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>E065 0118 "NN"</p> </div> </div>						



## LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	8	5	63%	3	38%

Sustancias negativas para LSD



## 2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Adulterantes y suplantadores detectados
		+	%	-	%	
2CB	4	0		4	100%	MDMA, Alpha PVP, 2cb, sustancia desconocida

Sustancias negativas para 2CB



## COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	1	1	100%		

Porcentaje de cocaína en las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	1 muestra
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	



## COSTO PROMEDIO DE SPA ANALIZADAS

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$15.000*	\$150.000	\$103.000	Gramo
Éxtasis	\$12.000	\$50.000	\$30.000	Comprimido
LSD	\$15.000	\$40.000	\$26.000	Unidad
2CB	\$60.000	\$120.000	\$97.000	Gramo
Cocaína	\$30.000	\$30.000	\$30.000	Gramo

\* Este precio hace referencia a una Goma de la cual se desconoce el peso



## RELACIÓN DE TAMAÑO EN COMPRIMIDOS DE ÉXTASIS ANALIZADOS

**S (Ø 07MM)**  
**M (Ø 09MM)**  
**L (Ø 11MM)**  
**XL (Ø 13MM)**

0 MUESTRAS ( )  
2 MUESTRAS (5%)  
11 MUESTRAS (29%)  
25 MUESTRAS (66%)



## CONSUMO POR PRIMERA VEZ

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 1% equivalente a una persona con relación a los que ya la han consumido que equivalen a un 99%. La sustancia que por primera vez fue consumida en este evento es LSD.





## FRECUENCIA DE CONSUMO

Sustancia	Frecuencia Baja	Frecuencia Media	Frecuencia Alta	Consumo Ocasional
MDMA	1 vez mes	2 veces mes	4 veces mes	NO
Éxtasis	1 vez año	4 veces Trimestre	4 veces mes	NO
LSD	1 vez año	2 vez mes	5 veces mes	NO
2CB	1 vez año	2 veces mes	4 veces mes	NO
Cocaína	1 vez semestre	1 vez semestre	1 vez semestre	NO

Un 74% equivalente a 51 usuarios confirmaron que NO han consumido parte de la muestra antes de analizarla, contrario a un 26% reflejado en 18 usuarios que lo sí ha hecho; de estos últimos, han sentido efectos diferentes a las habituales 3 personas que representarían a un 17%, entre estos efectos cuentan que lo que consumieron les pareció suave y les genero un adormecimiento en la lengua; el 83% restante, es decir 15 personas asegura que el efecto sentido es normal. También hay que tener presente que ninguno de los usuarios asegura haber mezclado el consumo con otras Spa




## TIPO DE PROVEEDOR

Tipo	Cantidad	%
Regalo (Amigo)	11	18%
Desconocido	8	13%
Dealer de confianza	41	68%
Calle u Olla		
Internet		



## LUGAR DE ADQUISICIÓN

Se encuentra que el 62% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio, contrastando con tan solo el 1% que la adquirió en el evento; otro dato importante a tener en cuenta es que 36% restante lo obtuvieron en las localidades de Chapinero, La Candelaria, Suba y Usaquén en el distrito capital de Bogotá, de igual manera registran adquirir la sustancia en Medellín y fuera de Colombia como el caso de Holanda.



## GÉNERO Y UTILIZACIÓN DEL S.A.S. POR PRIMERA VEZ

MASCULINO: 40 PERSONAS (87%)

FEMENINO: 6 PERSONAS (13%)

OTRO: 0 PERSONAS (0%)

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 22 usuarios (48%), mientras que 24 usuarios (52%) utilizaron el servicio por primera vez.

De este último segmento, es decir los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por


Tipo	Cantidad	%
Sitio Web		
Redes Sociales	8	28%
Persona cercana	6	21%
Este Evento	3	10%
Otros Eventos	12	41%



## GRUPO ETARIO


Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	7	32%
de 24 a 29 años	10	45%
de 30 a 35 años	3	14%
de 36 a 41 años	1	5%
de 41 años en adelante	1	5%
Edad Máxima	46	
Edad Promedio	26	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios de Manizales, Medellín y Pereira.



**TOTAL SPA  
ANALIZADO**

**69**



**SPA ANALIZADAS**





87%



13%

PARTICIPACIÓN

**GÉNERO**




**PRECIO**

PROMEDIO GRAMO  
\$102.000 COP


PROMEDIO COMPRIMIDO  
\$30.000 COP




POSITIVO




NEGATIVO



**MDMA**



62,5%  
POSITIVO




37,5%  
NEGATIVO

### PRECIO

PROMEDIO CUADRO  
\$26.000 COP

# LSD



100%  
NEGATIVO

0%  
POSITIVO


### PRECIO

PROMEDIO GRAMO  
\$97.000 COP

# 2CB



PROMEDIO GRAMO  
\$30.000 COP






# INTERVENCIÓN ESTÉREO PICNIC 2018



Sustancias  
analizadas

**557**

(113 sustancias más  
que el año pasado)



Muestras  
Positivas

**477 (86%)**



Muestras  
Negativas

**80 (14%)**

(Bajó 1% con respecto  
al año anterior)



Usuarios que  
utilizaron S.A.S

**472**

(Subió 109 personas  
más con respecto  
al año anterior)

**IMPACTOS DIRECTOS: 3.000 PERSONAS**  
**IMPACTOS INDIRECTOS: 9.000 PERSONAS**

# RESULTADOS



## MDMA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Adulterantes y suplantadores detectados			
		+	%	-	%				
MDMA (Cristal)	115	101	88%	14	12%	Metanfetamina Alpha PVP PMA MXE Butilona Cafeína Sustancias desconocidas			
Sustancias negativas para MDMA									
M064 0218	M106 0218	M119 0218	M129 0218	M170 0218	M177 0218	M282 0218	M332 0218	M384 0218	M395 0218
M398 0218	M465 0218	M520 0218	M544 0218						




## ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Adulterantes y suplantadores detectados
		+	%	-	%	
ÉXTASIS	250	236	94%	14	6%	Alpha PVP Butilona MDPV Cafeína Sustancias desconocidas
Sustancias negativas para Éxtasis						
E150 0218 "NEXUS"	E227 0218 "DIAMANTE"	E230 0218 "CHUPA CHUPS"	E290 0218 "WARNER BROS"	E408 0218 "NN"	E374 0218 "OBAMA"	E388 0218 "BOB ESPONJA"
E214 0218 "TRUFA"	E407 0218 "INSTAGRAM"	E476 0218 "ILLUMINATI"	E501 0218 "SNAPCHAT"	E517 0218 "BOB ESPONJA"		



## LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	137	101	74%	36	26%
Sustancias negativas para LSD					



**2CB**

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Adulterantes y suplantadores detectados
		+	%	-	%	
2CB	16	3	19%	13	81%	MDMA Butilona MDPV Cafeína Sustancias desconocidas
Sustancias negativas para 2CB						







## COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	37	35	95%	2	5%
Porcentaje de cocaína de las muestras					
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)		07 muestras			
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)		11 muestras			
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)		15 muestras			
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)		02 muestras			



## KETAMINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
KETAMINA	1	1	100%		



## MEZCALINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MEZCALINA	1			1	100%



## COSTO PROMEDIO DE SPA ANALIZADAS

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$25.000*	\$240.000	\$104.000	Gramo
Éxtasis	\$7.000	\$50.000	\$30.000	Comprimido
LSD	\$7.000	\$70.000	\$29.000	Unidad
ZCB	\$50.000	\$150.000	\$79.000	Gramo
Cocaína	\$10.000	\$60.000	\$20.000	Gramo
Mezcalina	\$35.000	\$35.000	\$35.000	Micropunto
Ketamina	\$30.000	\$30.000	\$30.000	Gramo

\* Este costo hace referencia a una bolsa pequeña de Ziploc.



## RELACIÓN DE TAMAÑO EN COMPRIMIDOS DE ÉXTASIS ANALIZADOS

**S (Ø 07MM)**  
**M (Ø 09MM)**  
**L (Ø 11MM)**  
**XL (Ø 13MM)**

2 MUESTRAS (1%)  
 13 MUESTRAS (5%)  
 60 MUESTRAS (25%)  
 169 MUESTRAS (69%)



## CONSUMO POR PRIMERA VEZ

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 10% (53 usuarios) con relación a los que ya la han consumido que equivalen a un 90% (504 usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son éxtasis 57%, MDMA en cristal 23%, LSD 9%, 2CB 6%, Cocaína 2%, Ketamina 2% y Mezcalina 2%, representados en 30, 12, 5, 3, 1, 1 y 1 usuario respectivamente para cada sustancia anteriormente descrita.



## FRECUENCIA DE CONSUMO

Sustancia	Frecuencia Baja	Frecuencia Media	Frecuencia Alta	Consumo Ocasional
MDMA	Una vez al año	1 vez al mes	1 vez cada 2 días	SÍ
Éxtasis	Una vez al año	1 vez al mes	4 veces al mes	NO
LSD	Una vez al año	1 vez al mes	1 vez cada 2 días	SÍ
2CB	Una vez al año	1 vez al mes	4 veces al mes	NO
Cocaína	Una vez al año	3 veces al mes	Todos los días	SÍ
Ketamina	2 veces al año	2 veces al año	2 veces al año	NO

Un 75% equivalente a 420 usuarios confirmaron que NO han consumido parte de la muestra antes de analizarla, contrario a un 25% reflejado en 137 usuarios que lo sí ha hecho; de estos últimos, han sentido efectos diferentes a las habituales 50 personas que representarían a un 34%, entre estos efectos cuentan que se les adormeció la lengua, anestesia, angustia, ardor en la cara, sin efectos, muy baja, efectos muy pronto, muchas cafeínas, escalofríos, taquicardia, pánico, cansancio, alucinaciones leves sin distinguir colores o sonidos, muy fuertes, muy intenso, intoxicaciones, o muy suaves, en algunos casos, no hay empatía, no es constante, calambres, mucha ansiedad vómito y diarrea; el 66% restante, es decir 98 personas asegura que el efecto sentido es normal. También hay que tener presente que 81 personas aseguran haber mezclado el consumo con otras Spa, entre las sustancias con las que más mezclan el consumo se encuentran Alcoholes fuertes como whisky o vodka y cervezas, cigarrillo, hongos, Ketamina, energizantes, Marihuana, Popper, MDMA y Cocaína.



## TIPO DE PROVEEDOR

Tipo	Cantidad	%
Regalo (Amigo)	167	30%
Desconocido	81	15%
Dealer de confianza	303	54%
Calle u Olla	4	1%
Internet	2	0%



## LUGAR DE ADQUISICIÓN

Se encuentra que el 44% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio, contrastando con tan solo el 5% que la adquirió en el evento; otro dato importante a tener en cuenta es que 51% restante lo obtuvieron en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Puente Aranda Santa Fé, Suba, Teusaquillo y Usaquén en el distrito capital de Bogotá, de igual manera registran las siguientes ciudad y/o municipios de Colombia como es el caso de Bucaramanga, Cali, Chía, Envigado, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira y Suesca, para finalizar tenemos también registros de extranjeros o personas que adquirieron su SPA fuera de Colombia, entre las que resaltamos países y/o ciudades como Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Polonia.



## GÉNERO Y UTILIZACIÓN DEL S.A.S. POR PRIMERA VEZ

*MASCULINO: 342 PERSONAS (72%)*

*FEMENINO: 130 PERSONAS (28%), SUBIÓ 8% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR*

*OTRO: 0 PERSONAS (0%)*

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 218 usuarios (47%), mientras que 248 usuarios (53%) utilizaron el servicio por primera vez.

De este último segmento, es decir los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por


Tipo	Cantidad	%
Sitio Web	21	6%
Redes Sociales	89	26%
Persona cercana	83	24%
Este Evento	65	19%
Otros Eventos	83	24%




## GRUPO ETARIO

Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	99	39%
de 24 a 29 años	109	43%
de 30 a 35 años	37	15%
de 36 a 41 años	6	2%
de 41 años en adelante	6	2%
Edad Máxima		45
Edad Promedio		25
Edad Mínima		18

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios de Bucaramanga, Cajicá, Cali, Chía, Cota, Cúcuta, Florencia, Envigado, Medellín, Manizales, Neiva, Ocaña y Pereira; También accedieron al servicio usuarios de las ciudades y/o países como por ejemplo Cuenca y Quito del país vecino de Ecuador, Chicago, Inglaterra, Nueva York, Nueva Zelanda y Panamá City.



**TOTAL SPA ANALIZADO** 557



**SPA ANALIZADAS**





72%



28%

PARTICIPACIÓN

**GÉNERO**



**PRECIO**

PROMEDIO GRAMO  
\$104.000 COP

PROMEDIO COMPRIMIDO  
\$30.000 COP




92%

POSITIVO




8%

NEGATIVO



**MDMA**



73,7%

POSITIVO





26,3%

NEGATIVO

### PRECIO


PROMEDIO CUADRO  
\$29.000 COP

# LSD



81,3%

NEGATIVO



18,8%

POSITIVO



### PRECIO

PROMEDIO GRAMO  
\$79.000 COP

# 2CB




PROMEDIO GRAMO  
\$30.000 COP




# COMPARATIVO ESTÉREO PICNIC 2015 A 2018



■ Positivo    ■ Negativo




## SPA ANALIZADAS







# GÉNERO COMPARATIVO





## MDMA COMPARATIVO



- ESTEREO PICNIC 2018
- ESTEREO PICNIC 2017
- ESTEREO PICNIC 2016
- ESTEREO PICNIC 2015




POSITIVO




NEGATIVO



# LSD COMPARATIVO



■ ESTEREO PICNIC 2018 ■ ESTEREO PICNIC 2017  
■ ESTEREO PICNIC 2016 ■ ESTEREO PICNIC 2015




POSITIVO


NEGATIVO



## 2CB COMPARATIVO




■ ESTEREO PICNIC 2018  
■ ESTEREO PICNIC 2017  
■ ESTEREO PICNIC 2016  
■ ESTEREO PICNIC 2015



POSITIVO

NEGATIVO

# COCAÍNA COMPARATIVO



■ ESTEREO PICNIC 2018 ■ ESTEREO PICNIC 2017  
■ ESTEREO PICNIC 2016 ■ ESTEREO PICNIC 2015




# INTERVENCIÓN BAUM 2018



Sustancias analizadas

**283**



Muestras Positivas

**248 (88%)**

(Subió 6,4% con respecto al año anterior)



Muestras Negativas

**35 (12%)**



Usuarios que utilizaron S.A.S

**250**

(Subió 23 personas más con respecto al año anterior)

**IMPACTOS DIRECTOS: 1.000 PERSONAS**

**IMPACTOS INDIRECTOS: 3.000 PERSONAS**



## ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	168	162	96%	6	4%


Sustancias negativas para Éxtasis



## LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	32	25	78%	7	22%

Sustancias detectadas como negativo para LSD





**2CB**

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	15	4	27%	11	73%

Sustancias negativas para 2CB



**KETAMINA**

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
KETAMINA	3	3	100%		





## COSTO PROMEDIO DE SPA ANALIZADAS

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$35.000*	\$150.000	\$105.000	Gramo
Éxtasis	\$15.000	\$70.000	\$30.000	Comprimido
LSD	\$8.000	\$50.000	\$30.000	Unidad
2CB	\$60.000**	\$150.000	\$107.000	Gramo
Ketamina	\$60.000	\$65.000	\$62.000	Gramo
Ketamina	\$50.000	\$50.000	\$50.000	50 Mililitros

\* Este precio hace referencia a una capsula de la cual se desconoce el peso

\*\* Este precio corresponde a medio gramo aproximadamente



## RELACIÓN DE TAMAÑO EN COMPRIMIDOS DE ÉXTASIS ANALIZADOS

<b>S (Ø 07MM)</b>	0 MUESTRAS ( )
<b>M (Ø 09MM)</b>	2 MUESTRAS (1%)
<b>L (Ø 11MM)</b>	37 MUESTRAS (23%)
<b>XL (Ø 13MM)</b>	125 MUESTRAS (76%)



## CONSUMO POR PRIMERA VEZ

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 9% (24 usuarios) con relación a los que ya la han consumido que equivalen a un 91% (258 usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son comprimidos Éxtasis y cristales MDMA cada uno representa un 38%, es decir a 9 personas en cada sustancia, en el caso de las sustancias LSD y 2CB cada uno se representan con un 3% que equivalen a 3 usuarios para cada sustancia descrita anteriormente.



## FRECUENCIA DE CONSUMO

Sustancia	Frecuencia Baja	Frecuencia Media	Frecuencia Alta	Consumo Ocasional
MDMA	Una vez al año	1 vez al mes	4 veces al mes	NO
Éxtasis	Una vez al año	1 vez al mes	4 veces al mes	NO
LSD	Una vez al año	1 vez al mes	4 veces al mes	NO
2CB	2 veces al año	1 vez al mes	4 veces al mes	NO
Ketamina	4 veces al año	2 veces al mes	4 veces al mes	NO

Un 78% equivalente a 219 usuarios confirmaron que NO han consumido parte de la muestra antes de analizarla, contrario a un 22% reflejado en 63 usuarios que lo sí ha hecho; de estos últimos, han sentido efectos diferentes a las habituales 12 personas que representarían a un 19%, entre estos efectos cuentan que lo que consumieron les pareció muy fuerte en base a experiencias anteriores, el efecto deseado no fue constante, les generó secuelas días anteriores, falta de sueño, náuseas, veían borroso, falta de aire o en algunos casos el efecto no se sintió o estuvo bastante suave; el 81% restante, es decir 51 personas asegura que el efecto sentido es normal. También hay que tener presente que 31 personas aseguran haber mezclado el consumo con otras SPA, entre las sustancias con las que más mezclan el consumo se encuentran Alcoholes fuertes como whisky o vodka y cervezas, energizantes, Marihuana, Popper, MDMA y Cocaína.



## TIPO DE PROVEEDOR

Tipo	Cantidad	%
Regalo (Amigo)	88	35%
Desconocido	45	18%
Dealer de confianza	117	46%
Calle u Olla	3	1%
Internet	1	0%



## LUGAR DE ADQUISICIÓN

Se encuentra que el 30% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio, contrastando con tan solo el 7% que la adquirió en el evento; otro dato importante a tener en cuenta es que 64% restante lo obtuvieron en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Rafael Uribe, Suba, Teusaquillo y Usaquén en el distrito capital de Bogotá, de igual manera registran las siguientes ciudad y/o municipios de Colombia como es el caso de Cali, Chía, La Calera, Medellín, Pereira y Santa Marta, para finalizar tenemos también registros de extranjeros o personas que adquirieron su SPA fuera de Colombia, entre las que resaltamos países y/o ciudades como Atlanta y New York de Estados Unidos, Holanda y México.



## GÉNERO Y UTILIZACIÓN DEL S.A.S. POR PRIMERA VEZ

MASCULINO: 202 PERSONAS (81%)

FEMENINO: 48 PERSONAS (19%)

OTRO: 0 PERSONAS (0%)

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 146 usuarios (58%), mientras que 104 usuarios (42%) utilizaron el servicio por primera vez.

De este último segmento, es decir los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por


Tipo	Cantidad	%
Sitio Web	13	11%
Redes Sociales	33	27%
Persona cercana	27	22%
Este Evento	17	14%
Otros Eventos	33	27%




## GRUPO ETARIO

Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	41	42%
de 24 a 29 años	44	45%
de 30 a 35 años	11	11%
de 36 a 41 años	1	1%
de 41 años en adelante	0	
Edad Máxima	38	
Edad Promedio	24	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios de Armenia, Cali, Chía, Manizales, Medellín, Mosquera, Pereira y Santa Marta; También accedieron al servicio usuarios de las ciudades y/o países como por ejemplo de Costa Rica.



**TOTAL SPA ANALIZADO** 283



**SPA ANALIZADAS**



81%



19%

PARTICIPACIÓN

**GÉNERO**



**PRECIO**

PROMEDIO GRAMO  
\$105.000 COP

PROMEDIO COMPRIMIDO  
\$30.000 COP




93%

POSITIVO




7%

NEGATIVO




**MDMA**





78%

POSITIVO




21%

NEGATIVO

## PRECIO


PROMEDIO CUADRO  
\$30.000 COP

# LSD



73,3%

NEGATIVO



26,7%

POSITIVO

## PRECIO

PROMEDIO GRAMO  
\$107.000 COP


# 2CB




# COMPARATIVO BAUM 2015 A 2018



■ Positivo ■ Negativo




## SPA ANALIZADAS







# GÉNERO COMPARATIVO





## MDMA COMPARATIVO



- Baum Festival 2018
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2015




POSITIVO




NEGATIVO


# LSD COMPARATIVO




- Baum Festival 2018
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2015




## 2CB COMPARATIVO



- Baum Festival 2018
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2015



# COCAÍNA COMPARATIVO



■ Baum Festival 2018

■ Baum Festival 2017

■ Baum Festival 2016

■ Baum Festival 2015

